

ИНСТРУКЦИЯ

по проведению дезинфекционных мероприятий в период осложнения эпидемиологической ситуации

(Для учреждений социальной защиты)

Инструкция разработана в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 23.01.2020г № 02/770-2020-32 (рекомендации НИИ «Дезинфектологии» Роспотребнадзора по осуществлению дезинфекционных работ на объекте).

Профилактическая дезинфекция - начинается немедленно при возникновении угрозы заболевания с целью предупреждения проникновения и распространения возбудителя заболевания в коллективы людей на объектах, в учреждениях, на территориях и т.д., где это заболевание отсутствует, но имеется угроза его заноса извне.

Включает меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или протирку их кожными антисептиками, регулярное проветривание помещений, проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств.

1. На объекте в период осложнения эпидемиологической ситуации с профилактической целью, осуществляется силами собственного персонала:

1. Обязательный контроль термометрии лиц из КНР (с использованием бесконтактного термометра) – **по прибытию в учреждение, далее - ежедневно.**

2. Ежедневная уборка с применением дезинфицирующих средств:
- пол в помещениях (холлы, комнат, комнат приготовления и приема пищи, постирочные, внутренняя и внешняя поверхность стиральных машин, сушильные комнаты, приспособления для сушки белья, гладильные и пр.) – **2 раза в день утром и вечером;**

- дверные ручки, вращающиеся крестовины при входе, перила лестничных пролетов, кулеры, банковские терминалы (при наличии), лифтовое оборудование (кнопки лифта) – **каждый час;**

- предметы обстановки комнат для проживания, приготовления и приема пищи (спинки кроватей, прикроватные тумбочки, стулья, столы, графины для воды санитарно-техническое оборудование, в том числе вентили кранов), подоконники, санитарные узлы и душевые (пол, санитарно-техническое оборудование, в том числе вентили кранов, спуск бачков унитаза) – **1 раз в день во время уборки комнаты;**

- общественные санитарные узлы и душевые (пол, санитарно-техническое оборудование, в том числе вентили кранов, спуск бачков унитаза), расположенные на этажах – **2 раза в день.**

- уборочный инвентарь после проведения уборки подлежит обязательной дезинфекции.

3. Обеззараживание воздуха в помещениях – необходимо ежедневно использовать ультрафиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа (рециркуляторы), которые возможно применять круглосуточно в присутствии людей (холлы, помещения массового скопления людей). Устанавливать по периметру помещения.

Количество необходимых облучателей рассчитывается в соответствии с инструкцией их применения, на кубатуру помещения в котором они будут установлены.

Проводить регулярное проветривание помещений. Для обеззараживания воздуха в комнатах для проживания лиц, **прибывших/контактных из КНР,** использовать передвижные бактерицидные облучатели закрытого/открытого типа – устанавливать в центре комнаты, продолжительность работы для достижения бактерицидного эффекта, рассчитывается в соответствии с инструкцией по их применению.

4.Руки персонала - частое мытье рук, использование кожных антисептиков.

5. Предусмотреть наличие на объекте кожных антисептиков для **обработки рук проживающих,** установить их в доступных местах в холлах.

6.Обеспечить персонал защитными **медицинскими масками** на период **осложнения эпидемиологической ситуации.**

7. **Очистка и дезинфекция системы вентиляции** и кондиционирования воздуха не реже 1 раза в месяц.

Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения.

II. Очаговая дезинфекция на объекте (в случае выявления больного)

1. При выявлении студента **с повышенной температурой, его необходимо изолировать** в отдельное помещение или его комнату, заклеить воздухонепроницаемым материалом решетку вытяжной вентиляции (при наличии), **немедленно вызвать скорую помощь для госпитализации больного.**

2. До приезда скорой помощи для госпитализации **больного** проводить текущую дезинфекцию в течение всего времени нахождения **больного на объекте, силами персонала учреждения.** Для текущей дезинфекции следует применять дезинфицирующие средства, разрешенные к использованию в присутствии людей, способом протирания. Столовую посуду, белье больного, предметы ухода обрабатывают способом погружения в растворы дезинфицирующих средств.

Гигиеническую обработку рук с применением спиртосодержащих кожных антисептиков следует проводить после каждого контакта с кожными покровами больного (потенциально больного), выделениями, предметами ухода, после контакта с оборудованием, мебелью и другими объектами, находящимися в непосредственной близости от больного.

Воздух в присутствии людей рекомендуется обрабатывать с использованием технологий и оборудования, разрешенных к применению в установленном порядке, на основе использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов).

3. После госпитализации больного **проводят заключительную дезинфекцию силами специалистов ГУП «Московский городской центр дезинфекции» (ГУП «МГЦД»):**

- **обработка поверхностей в помещении**, где находился больной с применением дезинфицирующих средств - пол, подоконники, дверные ручки, предметы обстановки номера - спинка кровати, прикроватные тумбочки, стулья, стол, санитарный узел и душевая (пол, санитарно-техническое оборудование, в том числе вентили кранов, спуск бачков унитаза);

- **посуда** - способом замачивания в растворе дезинфицирующего средства;

- **воздух** в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием **открытых ультрафиолетовых облучателей**, устанавливая в центре комнаты, продолжительность работы для достижения бактерицидного эффекта, рассчитывается в соответствии с инструкцией по их применению. **Количество необходимых облучателей рассчитывается в соответствии с инструкцией их применения** на кубатуру помещения, в котором они будут установлены;

- **остатки пищи** обеззараживаются с использованием дезинфицирующих средств.

- **постельные принадлежности** после госпитализации проживающего сдаются на обработку в дезинфекционную камеру.

При проведении заключительной дезинфекции способом орошения используют средства индивидуальной защиты (СИЗ). Органы дыхания защищают респиратором, глаз –защитными очками или используют противоаэрозольные СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой частью.

Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке. Для дезинфекции могут быть использованы дезинфицирующие средства из различных химических групп, **по режиму для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях**, например:

Группа	Наименование препарата	Концентрация Рабочего раствора (%)	Время экспозиции (минуты)
Хлорактивные	Хлорамин Б	1,0%	60

	Хлор-актив	0,016	60
	Септолит ДХЦ	0,016	60
	Жавель - Солид	0,015%	60
	Жавельон	0,06%	60
	Хлормикс	0,03%	30
Кислородактивные	Перекись водорода	3,0%	30
ЧАС	Экор	0,1	60
	Трилокс	0,7	60
	Экодез		
	Мирадез-Базик	0,2	60
	Сепдезин актив	0,1	60
Гуанидиновые	Ультрадез Форте	1,0	30
	Необак плюс	0,1	60
Спирты	Кожные антисептики для обработки рук персонала		
	«Бонадерм», «Альфасептин», «Октенисепт», «Чистея», «Экобриз антисептический гель» и прочие.		

Экспозиция – это время нахождения рабочего раствора дезинфицирующего средства на поверхности обрабатываемого объекта.

Регламент использования дезинфицирующего средства определен Инструкцией по применению отдельных дезинфицирующих средств, где, в том числе, разъясняется необходимость/отсутствие необходимости смывать дезинфицирующее средство после его экспозиции).

На каждом объекте должен быть **неснижаемый запас** дезинфицирующих средств, исходя из расчетной потребности, ветоши, уборочного инвентаря.